

SOBRE EL GÉNERO *ARMERIA* EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA (ANDALUCÍA, ESPAÑA)

Baltasar CABEZUDO*, Federico CASIMIRO-SORIGUER SOLANAS
y Andrés V. PÉREZ LATORRE

Departamento de Biología Vegetal. Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga.
Campus de Teatinos. 29071, Málaga

*Autor para correspondencia: bcabezudo@uma.es

Recibido el 1 de septiembre de 2015, aceptado para su publicación el 3 de octubre de 2015

RESUMEN. *Sobre el género Armeria en la provincia de Málaga (Andalucía, España).* Las poblaciones del género *Armeria* localizadas en las sierras de Aguas y Alcaparaín, ambas en la provincia de Málaga, se han incluido tradicionalmente en *Armeria villosa* subsp. *carratracensis* (Bernis) Nieto Feliner. El estudio del material de ambas sierras ha puesto de manifiesto que en realidad se trata de dos entidades taxonómicas distintas. Las poblaciones de la Sierra de Alcaparaín, sobre dolomías, se identifican como *Armeria grajoana* Casimiro-Soriguer Solanas & Cabezudo, **sp. nov.** Las poblaciones de Sierra de Aguas, sobre serpentinas/peridotitas, se identifican como *Armeria villosa* subsp. *seperinticola* Cabezudo, Pérez Latorre & Casimiro-Soriguer Solanas, **subsp. nov.**

Palabras clave. Sierra de Aguas, Sierra de Alcaparaín, *Armeria grajoana*, *Armeria villosa* subsp. *seperinticola*

SUMMARY. *Contribution to genus Armeria in Malaga province (Andalusia, Spain).* The populations of the genus *Armeria* located in the mountain ranges of Aguas and Alcaparaín, both in the province of Malaga (Spain), have traditionally been included in *Armeria villosa* subsp. *carratracensis* (Bernis) Nieto Feliner. The studied material, collected in both ranges, has shown that two independent taxa exist. The populations of the Sierra de Alcaparaín on dolomites, were identified as *Armeria grajoana* Casimiro-Soriguer Solanas & Cabezudo, **sp. nov.** The populations of Sierra de Aguas, living on peridotites, were identified as *Armeria villosa* subsp. *seperinticola* Cabezudo, Perez Latorre & Casimiro-Soriguer Solanas, **subsp. nov.**

Key words. Sierra de Aguas, Sierra de Alcaparaín, *Armeria grajoana*, *Armeria villosa* subsp. *seperinticola*

INTRODUCCIÓN

En Mayo del 2014 y en el marco de un proyecto sobre el estudio de la flora y vegetación de Sierra de Alcaparaín (Málaga; Casarabonela/ Ardales/ Carratraca) localizamos

una pequeña población de una especie del género *Armeria* que nunca antes habíamos visto en el marco biogeográfico del sector Rondeño (provincia Bética) (Pérez Latorre & Cabezudo, 2002). La población se localizaba en las crestas de la sierra, en grietas de rocas dolomíticas,

muy castigadas por el viento y por la presión del ganado. La mayoría de los individuos localizados se encontraban ramoneados y solo unos pocos habían llegado a florecer.

Para la identificación del material utilizamos, sin resultado, la excelente monografía sobre el género *Armeria* (Nieto Feliner, 1990) y en ella localizamos una referencia a la Sierra de Alcaparaín (Sierra de Caparaín (sic), pr. Carratraca, 19 jun. 1930, leg. C. Vicioso) como indicación locotípica (in. loc.) de *A. villosa* subsp. *carratracensis* (Bernis) Nieto Feliner in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 337(1987). Como basiónimo de esta subespecie se indica a *A. maritima* subvar. *carratracensis* Bernis in Anales Inst. Bot. Cavanilles 12 (2): 122 (1955) y en la iconografía de la misma se representa un ejemplar recolectado en la Sierra de Aguas, pr. Carratraca, Málaga (MA 360159) (Nieto Feliner, 1990: 687).

El estudio del material recolectado en la Sierra de Alcaparaín dio como resultado diferencias significativas con *A. bourgaei* (s.l.), *A. filicaulis* (s.l.), *A. malacitana*, *A. colorata* y *A. villosa* (s.l.). Todo el material visto, en pliegos y en el campo, de *A. malacitana*, *A. colorata* y *A. villosa* (s.l.) presentan siempre la corola blanca. *A. bourgaei*, *A. filicaulis* y *A. malacitana* viven siempre sobre calizas, dolomías y micaesquistos. *A. villosa* subsp. *carratracensis* (sensu Nieto Feliner, 1987) y *A. colorata* lo hacen siempre sobre serpentinas, ambas con corola blanca (Nieto Feliner, 1987; Pérez Latorre *et al.*, 2013).

Dado que el único material previo localizado de este género en la Sierra de Alcaparaín era el recolectado por Vicioso en 1930 (Nieto Feliner, 1990), solicitamos este pliego (MA 145420) al Real Jardín Botánico de Madrid (MA), al ser dicho material el Holotipus (fig. 1) de *A. villosa* subsp. *carratracensis* (sensu Nieto Feliner, 1987), nos fue remitido solo una copia escaneada. El pliego (MA 145420) consta de varios ejemplares y 4 etiquetas, una primera manuscrita (a tinta) con el nombre de *Armeria*

villosa Gir. var. *carratracensis* C. Vic. (nov. var.). In dumetis. Sierra Caparain. Carratraca (Málaga). 19.VI. 1930. C. Vicioso. Corollis rosas (margen inferior y a lápiz). Una segunda etiqueta (a máquina) que reproduce la etiqueta anterior excepto el termino referido al color de la corola. Una tercera (a máquina y manuscrita) con el nombre de *Armeria maritima* (Mill.) Willd., sensu nov (tachado), subsp. *eumaritima* sensu Bern., var. *villosa* (Gir) Bern. (series A), subvar. *carratracensis* Bern. det. Bernis. La cuarta etiqueta corresponde a la revisión que para Flora Iberica realizó el Dr. G. Nieto Feliner y dice lo siguiente: *A. villosa* Girad subsp. *carratracensis* (Bernis) Nieto Feliner. Holotypus (*A. maritima* subvr. *carratracensis* Bernis). Anales Inst. Bot. Cavanilles 12 (2):122 y Lam 36 A (1955). Gonzalo Nieto Feliner. Real Jardín Botánico. Madrid. 1986 (existe una flecha que indica como holotypus al ejemplar central del pliego).

Armeria maritima subvar. *carratracensis* fue descrita como subvar. nova por Bernis (Bernis 1955:122), utilizando para su confusa descripción morfológica material de dos entidades distintas, el pliego anteriormente descrito (MA 145420) y dos pliegos procedentes de Sierra Llana de Antequera (MA145419) y Alfarnate (MA 145441) que en realidad corresponden a *A. villosa* subsp. *longiaristata* como veremos posteriormente. Como tipo indica el ejemplar fotografiado en la lámina 36 (Bernis 1955: 234) del pliego recolectado por Vicioso (MA 145420), que corresponde al ejemplar (fotografía invertida) reseñado por Nieto Feliner en el pliego en cuestión. Al comparar la descripción de Bernis (Bernis 1955:122) de esta subvar. *carratracensis* con la de *A. villosa* subsp. *carratracensis* (Nieto-Feliner, 1990: 689) comprobamos que tenían que haber sido realizadas sobre materiales distintos.

Para los datos ecológicos y morfológicos de *Armeria maritima* subvar. *carratracensis*, Bernis (1955:124-125) tiene en cuenta tres

pliegos correspondientes a las localidades de Sierra de Caparaín (calizas y dolomías), Sierra Llana de Antequera (calizas), recolectados ambos por Vicioso en 1930, y un pliego recolectado en la localidad de Alfarnate (calizas) por Gros en 1919. Es de suponer que Bernis no conoce ni visita el lugar de recolección de estos pliegos, por lo que, utilizando un desconocido mapa geológico, indica que “*por lo menos dos de las tres localidades conocidas corresponden a regiones donde dominan pizarras silúricas o esquistos arcaicos, acompañados de rocas peridotíticas*”. Hemos estudiado el material de Sierra Llana de Antequera y de Alfarnate mencionados por Bernis (l.c.) e identificados por él como *A. maritima* subvar. *carratracensis* Bern. (MA145419) y *A. maritima* subvar. *genuina* Bern. (MA 145441) y que posteriormente fueron ambos identificados en 1987 por Nieto Feliner como *A. villosa* subsp. *longiaristata* (Boiss. & Reuter) Nieto Feliner. La utilización por Bernis del material procedente de Sierra Llana de Antequera, que el mismo considera que no pertenece claramente a la subvar. *carratracensis*, para la descripción de esta subvar., ha motivado que en dicha descripción aparezcan algunos datos desviantes respecto al material de Sierra de Alcaparaín. Tanto en Sierra Llana como en las sierras de Alfarnate no se localiza ningún afloramiento de peridotitas ni de pizarras, mientras que la Sierra de Alcaparaín (Caparaín) es, casi en su totalidad, de naturaleza dolomítica, con una pequeña mancha de peridotitas en su contacto con la Sierra de Aguas, esta última íntegramente de naturaleza peridotítica (López González, 1975).

Quizás esta consideración edafológica de Bernis asignando un sustrato peridotítico a este material de la Sierra de Alcaparaín y considerar que, geológicamente, todo el termino municipal de Carratraca es de peridotitas, es lo que ha podido generar el conflicto de incluir bajo un mismo epíteto específico, *carratracensis*, a dos entidades distintas del género *Armeria*

que viven en el mismo termino municipal (Carratraca) pero sobre sustratos geológicos muy diferentes: Sierra de Alcaparaín (dolomías) y Sierra de Aguas (peridotitas y serpentinas). El propio Nieto Feliner (1987: 337) al publicar la combinación nueva de *A. villosa* subsp. *carratracensis* ignora la localidad del pliego de Alcaparaín y asigna como distribución de la subespecie Sierra de Aguas (Carratraca) y Sierra Parda (Tolox) ambas sierras totalmente constituidas por peridotitas.

Para ver realmente sobre que sustrato geológico crece el material de *Armeria villosa* var. *carratracensis* recolectado por Vicioso en la Sierra de Caparaín, hemos acudido al trabajo sobre la Vegetación y Flora Forestal de la Provincia de Málaga (Ceballos y Vicioso, 1933: 83 y 149) en el que dice que “*En la vertiente oriental de la Sierra de Caparaín aparece un suelo con reacción básica, pobre, de poco fondo y con frecuentes afloramientos de la roca madre (calizas triásicas)*”. Por tanto consideramos que el material de *Armeria villosa* var. *carratracensis* recolectado por Vicioso lo fue sobre sustratos dolomíticos y nunca sobre peridotitas (serpentinas), así lo atestigua además la presencia de numerosas especies calcícolas-dolomíticas en la Sierra de Caparaín (Ceballos y Vicioso, 1933: 84). En un estudio de la Sierra de Aguas (López González, 1975) se cita *Armeria allioides* Boiss. en las peridotitas de la parte alta de la sierra. No hemos visto este material, pero todo lo recolectado por nosotros en esta sierra corresponde a *A. villosa* subsp. *carratracensis* (sensu Nieto Feliner, 1987).

Sin justificación morfológica, ni fitosociológica, ni ecológica, Rivas Martínez (1988:115) publica *Armeria carratracensis* (Bernis) Rivas Martínez *comb. nov.* e indica como basiónimo a *Armeria maritima* subvar. *carratracensis* Bernis in *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 12 (2):122 (1955). Suponemos que Rivas Martínez no ha visto el tipo (MA 145420) pues no hace referencia al mismo en

su publicación, y en el pliego de referencia (MA 145420) no aparece ninguna información manuscrita sobre su utilización por el Dr. S. Rivas Martínez que haga referencia a esta combinación, es por tanto, como muchas, una combinación teórica y sin fundamentos. Lo indudable es que Rivas Martínez se está refiriendo a las poblaciones sobre peridotitas tal como se indica en Rivas Martínez et al. (1991: 16) donde dice claramente que la especie es: “*Bermejense. En tomillares sobre litosuelos serpentinizados*” y en otras dos publicaciones posteriores (Rivas Martínez 2011a: 326 y 2011b: 498) donde se ratifica en su criterio de que es una entidad característica de comunidades sobre peridotitas (*Asperulo asperrimae-Staehelinetum baeticae* Rivas Goday & Rivas martinez 1969). Nieto Feliner (1990: 855) sinonimiza esta combinación a *Armeria villosa* subsp *carratracensis* y Rivas Martínez et al. (1991:16) sinonimizan la subsp *carratracensis* de Nieto Feliner a su *A. carratracensis*. Consideramos por tanto que esta combinación de Rivas Martínez (1988) no es válida al considerar como basiónimo del material sobre peridotitas a lo descrito por Bernis (1955). Rivas Martínez nunca hace mención al pliego de referencia (holotypus) recolectado por Vicioso en 1930 ni al hábitat (dolomías) de los materiales empleados por Bernis para *Armeria maritima* subvar. *carratracensis* (Bernis, 1955) y por tanto consideramos que el epíteto *carratracensis* no puede aplicarse a las plantas localizadas sobre peridotitas/serpentinias.

La rigidez del Código Internacional de Nomenclatura Botánica complica, en determinados casos como este, la delimitación y denominación clara de algunas entidades taxonómicas, siendo por el contrario muy laxo con las condiciones necesarias para dar por válida algunas nuevas combinaciones en las que los autores de las mismas ni siquiera han manejado o visto material de los taxones sobre las que las realizan. Empezar de cero con

este complicado grupo de especies y olvidarse de la pesada e histórica mochila taxonómica y nomenclatural podría aclarar mucho la diversidad del género *Armeria*.

C. Vicioso nunca publicó su variedad *Armeria villosa* var. *carratracensis* tal como aparece en el pliego MA 145420. El epíteto *carratracensis*, en el sentido de C. Vicioso, se refiere al termino municipal de Carratraca ya que en su zona mas occidental se localiza parte de la Sierra de Alcaparaín y no a la Sierra de Carratraca (llamada también de Aguas) que se localiza casi en su totalidad en los términos de Casarabonela y Alora, con una porción muy pequeña en el oriente del término de Carratraca. Todo lo publicado bajo los nombres de *A. villosa* subsp. *carratracensis* (Bernis) sensu Nieto Feliner y *A. carratracensis* sensu Rivas Martínez corresponden a materiales sobre serpentinias y nunca hacen referencia a sustratos calizos o dolomíticos tal como indica C. Vicioso para su material de la var. *carratracensis*. Con el fin de diferenciar claramente las poblaciones sobre serpentinias de las que viven sobre sustratos dolomíticos y no utilizar para ambas entidades el confuso epíteto de *carratracensis* es por lo que proponemos el epíteto de *grajoana* (en referencia al pico de El Grajo) para las poblaciones sobre dolomías reseñadas por C. Vicioso, y proponer una subespecie nueva para las poblaciones sobre serpentinias. Por todo lo anterior consideramos que, a pesar de compartir hasta el momento el mismo holotipo, (Sierra de Alcaparaín, MA 145420), *A. maritima* subvar. *carratracensis* Bernis (calizas y dolomías) y *A. villosa* subsp. *carratracensis* (Bernis) Nieto Feliner (peridotitas/serpentinias), son dos entidades taxonómicas distintas, y en consecuencia proponemos lo siguiente:

Armeria grajoana Casimiro-Soriguer Solanas & Cabezudo, *sp. nov.*

Armeria maritima subvar. *carratracensis* Bernis in Anales Inst. Bot. Cavanilles 12 (2) :



Figura 1. Holotypus de *Armeria grajoana*. Holotype of *Armeria grajoana*.

122 (1955) (basi6n. solo el *typus*).

A. villosa var. *carratracensis* C. Vicioso nom. in sched. (MA 145420).

Holotypus: Sierra de Capara6n. Carratraca (M6laga), 19.VI.1930, leg. C. Vicioso (MA 145420) (sub. *A. villosa* var. *carratracensis* C. Vicioso) (fig. 1)

Hemicript6f6ito con cepa ramificada y vertical de ramas muy apretadas. Cepa cubierta de hojas viejas que se deshacen en fibras. Planta glabra, excepto generalmente las hojas. Hojas (25)30-70 (95)x(2,5)3-5(6) mm., homomorfas, lanceoladas, patentes o erectas, generalmente atenuadas en un largo peciolo, con margen escarioso estrecho, de glabras a generalmente ciliadas exclusivamente en el margen; con granulaciones blancas en el limbo. Escapos (12)15-18(20) cm., de rectos a flexuosos en su mitad superior, glabros. Involucro 1,4-1,8 (2) cm. Vaina involucral de longitud similar al di6metro del involucro o frecuentemente algo menor 4/5. Br6ctea involucral 7-12, lisas, glabras, con margen escarioso, generalmente crecientes en tama6o de las externas a las



Figura 2. *Armeria grajoana*. Aspecto general de la planta. *Biotype* .

internas; las mas externas gradualmente atenuadas hacia el 6pice; las medias e internas ovadas contra6das en el 6pice y mucronadas, las internas con amplio margen escarioso, con el mucr6n y la parte central frecuentemente rojizas. Br6ctea espicular totalmente escariosa y concolora de tama6o similar a las br6ctea involucral interna, ovadas. C6liz 6,5-7 (8) mm., holopleur6tico, con hileras de pelos densas, pelos largos que pr6cticamente ocultan los surcos intercostales; espol6n 0,4-0,5 mm., de 1/5 a 1/6 del tama6o del tubo. L6bulos 1,5-2 mm., marcados, triangulares, cortamente aristados; l6bulos 1/5 de la longitud del c6liz. Corola rosa-p6rpura. (figs. 2 y 3)

Rootstock branched. Scapes up to 18 cm. Involucre up to 2 cm. Involucral bracts scarcely thick, with increasing size from the external towards the internal ones. Bracts spicular and totally scarious, with similar size to the involucral internal ones. Calyx up to 7 mm., shortly-awned. Corolla purplish-pink.

Fenolog6a. Floraci6n: IV-VI. Fructificaci6n: V-VII

Ecolog6a. Rup6cola, subrup6cola y matorrales xer6filos sobre suelos dolom6ticos.

Distribuci6n. Endemismo de la Sierra de Alcapara6n (M6laga)

Biogeograf6a. Subsector Rondense (sector Ronde6o, provincia B6tica, Subregi6n Mediterr6nea-Occidental).

Altitud: 1000-1293 m

Fitosociolog6a. Comunidades dolom6ticas del *Lavandulo lanatae-Ulicetum baetici* y *Galio baetici-Thymetum granatensis* Se acompa6a de especies como: *Thymus granatensis* subsp. *granatensis*, *Sideritis incana* subsp. *occidentalis*, *Ulex baeticus* subsp. *baeticus*, *Stipa tenacissima*, *Arenaria armerina*, *Jurinea pinnata* o *Ptilostemon hispanicus*.

Categor6a de amenaza (UICN). En Peligro Cr6tico (CR) (B1ab(ii,iv);C2a(i)). Se propone su inclusi6n en el Listado Andaluz de



Figura 3. *Armeria grajoana*. Escapo e inflorescencia. Inflorescence branch.

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluido el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas como especie amenazada con la categoría de *En Peligro de Extinción (EN)*.

Material estudiado: Málaga: Sierra de Caparaín (Cádiz?). 19/07/1930?. Vicioso (EMMA 11564). Carratraca. Sierra de Caparaín. In dumetis. 19/06/1930. Vicioso (MA 145420) Holotypus; ibídem. Sierra de Alcaparaín. El Grajo. Espolón norte. UF3577. Rupícola. Paredes verticales y repisas. Dolomías. 1150-1280 m.s.m. 05/06/2014. Casimiro-Soriguer Solanas (MGC 79121); ibídem. Blanquizar dolomítico en laderas pedregosas de fuertes pendientes. Dolomías disgregadas.

05/06/2014. Casimiro-Soriguer Solanas (MGC 79131); ibídem. Cabecera del arroyo del Conejo, ramal sureste. UF3478. Zona rocosa. Rupícolas y subrupícolas. Dolomías. 29/05/2015. Cabezado, Pérez Latorre, Hidalgo & Casimiro-Soriguer Solanas (MGC 81159). Carratraca/Casarabonela. Sierra de Alcaparaín. Crestería entre el Pico Valdivia y El Grajo. UF 3577. Zona muy rocosa. Dolomías. 1160-1293 m. s. m. 2/05/2014. Cabezado, Casimiro-Soriguer Solanas & García Sánchez (MGC 78499). Casarabonela. Sierra de Alcaparaín. Cerro de la Canana. UF3379. Roquedos. Dolomías. 1100-1182 m.s.m. 08/05/2014. Cabezado & Casimiro-Soriguer Solanas (MGC 78573); ibídem. 23/05/2014. Cabezado, Pérez Latorre & Casimiro-Soriguer Solanas (MGC 78856); ibídem. 29/05/2015. Cabezado, Pérez Latorre, Hidalgo & Casimiro-Soriguer Solanas (MGC 81150); ibídem. Pico del Grajo y alrededores. UF 3577. Crestería rocosa. Dolomías. 23/05/2014. Cabezado, Pérez Latorre & Casimiro-Soriguer Solanas (MGC 78846, 78842).

Observaciones. Hemos revisado el material del género *Armeria* utilizado para la realización de las Floras Vasculares de Andalucía Occidental (Valdés *et al.*, 1987) y de Andalucía Oriental (Blanca *et al.*, 2009) con el fin de localizar algún material semejante, en morfología y ecología, al recolectado por nosotros y C. Vicioso en la Sierra de Alcaparaín. En el Herbario de la Universidad de Sevilla (SEV) hemos localizado un pliego (original y tres duplicados) con material parecido al de Alcaparaín recolectado en Sierra Horconera: Pico Bermejo (Córdoba) (SEV 82315, 82316, 82314 y 76396) identificados originalmente como *A. maritima* subsp. *alpina* (Willd.) Pinto da Silva y publicado como tal por Devesa y Pinto da Silva (1984) y en Valdés *et al.* (1987: 297). Los pliegos fueron revisados para *Flora iberica* y tienen una etiqueta de corrección donde dice: “*Puede ser A. villosa x A. bourgaei* (no es *A. alpina*). Gonzalo Nieto Feliner. Real Jardín Botánico. Madrid . X. 1987 ”. Este material, procedente de Sierra Horconera, ha sido descrito posteriormente como *Armeria trianoi* (Nieto Feliner *et al.*, 2001:75). Visto el

material de esta especie hemos considerado que, a pesar del aparente parecido morfológico y a la similitud ecológica (calizas y dolomías), no se corresponde claramente con el recolectado por nosotros en Sierra de Alcaparaín, motivo por el cual, y hasta nuevos estudios, mantenemos independientes las identidades específicas de las poblaciones de Alcaparaín y Horconera.

Las diferencias más significativas de esta especie con *A. colorata*, *A. villosa* subsp. *serpentinicola*, *A. villosa* subsp. *longiaristata* y *A. trianoi* están representadas en la tabla 1.

Armeria villosa* subsp. *serpentinicola

Cabezudo, Pérez Latorre & Casimiro-Soriguer Solanas, **subsp. nov.**

- *Armeria villosa* subsp. *carratracensis* (Bernis) sensu Nieto Feliner in Anales Jard. Bot. Madrid 44:337(1987), excl. typus; in Flora Iberica 2: 689 (1987), excl. typus.

- *A. carratracensis* (Bernis) sensu Rivas-Martinez in Lagasalia 15(extra) :115 (1988), excl. typus.

- *A. allioides* sensu López in Acta Botanica Malacitana 1: 120 (1975), non Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 525 (1841), nom. illeg.

Holotypus: Málaga: Carratraca. Sierra de Aguas. UF38. Peridotitas. 2/06/2004. B. Cabezudo & O. Gavira. (MGC 63048) (fig. 4).

Hemicriptófito, con cepa vertical no ramificada. Cepa cubierta de hojas viejas que se deshacen en fibras. Hojas 30- 90 (110) x 1,5-7 mm. homomorfas, numerosas, de linear-lanceoladas a lanceoladas, trinervadas, glabras o ciliadas en el margen, este, a veces sinuado, limbo con granulaciones blancas, las externas generalmente rojizas. Escapos 25-45 cm., rectos, glabros. Involucro 17-23 mm. Vaina involucral 16-34 mm., de longitud similar o superior al diámetro del involucro. Brácteas involucrales 13-20, lisas (las externas a veces rugosas), consistentes, las externas




Figura 5. *Armeria villosa* subsp. *serpentinicola*. Escapo e inflorescencia. *Inflorescence branch*.

de mucronadas a largamente cuspidadas, de tamaño decreciente hacia el interior. Brácteas espiculares no enteramente escariosas, de iguales a algo más largas que las involucrales internas. Cáliz 8-9,5 mm., holopleurótico, con hileras de pelos densas; espolón 0,3-1,3 mm, de ¼ a 3/5 de la longitud del tubo; lóbulos 2-3 mm., triangulares muy marcados y largamente aristados, de 1/5 a 1/3 de la longitud del cáliz. Corola blanca. (figs.5 y 6).

Rootstock vertical and unbranched. Numerous leaves, the external reddish. Scapes up to 45 cm. Involucre up to 23 mm. Involucral bracts with decreasing size towards the inside. Involucral bracts spicular, not entirely scarious, equal to slightly longer than the internal ones. Calyx up to 9.5 mm., long-awned. Corolla white.



Figura 4. Holotypus de *Armeria villosa* subsp. *serpentinicola*. Holotype of *Armeria villosa* subsp. *serpentinicola*.

Fenología. Floración: IV-VI. Fructificación: V-VII

Ecología. Rupícola y subrupícola sobre suelos peridotíticos.

Distribución. Endemismo serpentínofito de la Sierra de Aguas (Málaga).

Biogeografía. Subsector Carratricense (sector Bermejense, provincia Bética, Subregión Mediterránea-Occidental).

Altitud. 750- 949 m

Fitosociología. Comunidad serpentínicola del *Galio boissierani-Staehelinetum baeticae*. Se acompaña de especies como: *Cerastium boissieri*, *Sesamoides canescens*, *Centaurea carratracensis*, *Alyssum serpyllifolium* subsp. *malacitanum*, *Galium boissieranum* y *Ptilotrichum longicaule*.

Categoría de amenaza (UICN). *En Peligro Crítico (CR)* (B1ab(ii,iv);C2a(i)). Se propone su inclusión en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluido el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas como especie amenazada con la categoría de *En Peligro de Extinción (EN)*.

Material estudiado. Málaga: Carratraca. Sierra de Aguas. Entre Álora y Carratraca. UF38. Serpentinatas. 800 m.s.m. 14/06/1973. Talavera & Valdés. (MGC 12652); íbidem. 13/05/1993. Asensi & Díez. (MGC 37088); íbidem. UF38. Peridotitas. 2/06/2004. B. Cabezudo & O. Gavira. (MGC 63048).

Observaciones. En un interesante trabajo sobre hibridaciones en el género *Armeria* y mas concretamente sobre el origen híbrido de *A. villosa* subsp. *carratracensis* (Nieto Feliner *et al.*, 1996) se pone de manifiesto la relación de esta subespecie con *A. colorata* (peridotitas) y *A. villosa* subsp. *longiaristata* (calizas/dolomías). El material utilizado de *A. villosa* subsp. *carratracensis* (Bernis) Nieto Feliner para este estudio procede de la Sierra de Aguas (peridotitas/serpentinatas), por lo que los resultados no pueden ser aplicados a la entidad *A. grajoana* de la Sierra de Alcaparaán



Figura 6. *Armeria villosa* subsp. *serpentinicola*. Aspecto general de la planta. *Biotype*.

(dolomías) y sí a la nueva entidad *A. villosa* subsp. *serpentinicola*.

Nuestras observaciones de campo y la revisión de material de herbario de *Armeria* recolectado sobre serpentinatas nos hacen apoyar las estrechas relaciones que esta subespecie tiene con *A. colorata* (Nieto Feliner *et al.*, 1996). Por el momento, y a la espera de un estudio mas completo de todo el grupo, consideramos que *A. villosa* subsp. *serpentinicola* es endémica de la Sierra de Aguas y que junto con *A. colorata* forman una entidad taxonómica diferenciada del conjunto de *A. villosa* s.l.

En dos trabajos realizados para evaluar el grado de amenaza de especies de la flora silvestre española (Cabezudo *et al.* 2000: 55 y 2003: 604) los datos relativos a *Armeria villosa* subsp. *carratracensis* sensu Nieto Feliner

	<i>A. colorata</i>	<i>A. villosa</i> subsp. <i>serpentinicola</i>	<i>A. villosa</i> subsp. <i>longistata</i>	<i>A. trianaei</i>	<i>A. grajoana</i>
Morfología de las hojas	Linear lanceoladas, vainas no fibrosas	Linear lanceoladas, vainas fibrosas	Lanceoladas, vainas fibrosas	Sublineares a linear lanceoladas, vainas no fibrosas	Lanceoladas a linear-lanceoladas, vainas fibrosas.
Longitud del escapo	17-30 cm	25-45 cm	20-45 cm	5-15 cm	15-18 cm
Diámetro del involucre	16-25 mm	17-23 mm	15-25 mm	13-16 mm	14-20 mm
Longitud vaina involucral	10-20 mm	15-30 mm	15-30 mm	4-9 mm	14-18 mm
Longitud del cáliz	5,5-6,5 mm	8-9,5 mm	8,5-11,5 mm	6,2-7,2 mm	6,5-7 mm
Morfología del cáliz	Lóbulos de ovados a casi nulos, medianamente aristados	Lóbulos triangulares, largamente aristados	Lóbulos agudos, largamente aristados	Lóbulos triangulares, medianamente aristados	Lóbulos triangulares, cortamente aristados
Color de la corola	Blanca	Blanca	Blanca	Rosa-purpura	Rosa-purpura

Tabla 1. Diferencias mas significativas de *A. grajoana* con táxones próximos. *Main differences among A. grajoana and nearly taxa.*

(1987) (*En Peligro* (B2ab(ii,iv))) se refieren exclusivamente a las poblaciones de *A. villosa* subsp. *serpentinicola* sobre peridotitas.

Otro material estudiado

Armeria bourgaei Boiss. ex Merino subsp. *bourgaei*

Jaén: Albanches de Úbeda. Sierra de Mágina. Sobre la Fuente del Espino. VG5976. calizas. 1800 m.s.m. 18/06/2002. Cabezudo, Pérez Latorre & Gil (MGC 52665, 53010); **Almería:** María. Sierra de María. Cara Norte, sobre los Alaminos. 1250-1750 m.s.m. 07/06/1995. Cabezudo, Pérez Latorre, Blanca & Cueto (MGC 39693)

Armeria bourgaei subsp. *lanceobracteata* (Lawrence) Nieto Feliner

Granada: Sierra de Guillimona. WH30. Pastos sobre calizas. 1750 m.s.m. 14/06/1986. Bayón, Galán & Nieto Feliner. (MA386477); Sierra del Cuarto. Lieux arides, sur le calcaire. 1800m.s.m. 06/1902. (MA145769)

Armeria bourgaei subsp. *willkommiana* (Bernis) Nieto Feliner

Murcia: Benizar. Rincón de las Cuevas. WH8835. Roquedo, calizas. 1000 m.s.m. 24/04/1997. C, Aedo, I. Álvarez, S. Castroviejo, R. Morales, F. Muñoz, M. Velayos & Al. (MA591195); Sierra de Espuña, Morrón de Espuña. In rupestribus calcareis. 23/06/1947. C. Vicioso (MA386529).

Armeria colorata Pau

Málaga: Istán. Entre el puerto del Algarrobo y el de la Refriega. UF1938055998. Matorrales y taludes. Peridotitas. 916-1166 m.s.m. 15/06/2012. Cabezudo & Casimiro-Soriguer Solanas (MGC75674); ibidem. Sierra Real. Serpentinias. 21/06/1996. Navas, Gil & Navas (MGC44201); ibidem. Cerro del Duque UF2055. Serpentinias. 940 m.s.m. 7/06/1996. Gil, Pérez Latorre & Navas (MGC 44198); ibidem. UF2056. Zona rocosa. Serpentinias. 26/07/2001. Navas, Gil & Navas. (MGC 49301). Casares. Sierra Bermeja. Pico de los Reales. Serpentinias. Grandes bloques de piedra. 11/06/1996. Navas, Cabezudo & Navas (MGC 44197, 44199). Tolox: Sierra de Tolox. Cerro Corona. Peridotitas. 30/6/1996. Gil, Pérez Latorre & Navas (MGC 47722). Coin. Sierra

Alpujata. Rio Pereila. UF 3952. Peridotitas. 680 m. s. m. 13/5/2009. Cabezudo, Pérez Latorre & Casimiro-Soriguer Solanas (MGC 69810).

Armeria filicaulis (Boiss.) Boiss. subsp. *filicaulis*

Granada: Alhama de Granada. P.N. Sierra de Tejada, Almijara y Alhama. Subida al Lucero. VF 1981. Dolomías. 1330-1510 m.s.m. 17/06/2004. Cabezudo, Pérez Latorre, Caballero & Gavira. (MGC 59672). **Málaga:** Cómpeta. Sierra Almijara. Del Puerto del Collado a Cerro Canillas. VF 1481. Dolomías. 1000 m.s.m. 2/07/1996. Gil, Cabezudo & Pérez Latorre (MGC 42240)

Armeria filicaulis subsp. *nevadensis* Nieto Feliner, Roselló & Fuertes

Granada: Sierra Nevada. El Dornajo. 4/08/1984. Cabezudo, Guerra & Pérez. (MGC 41679). Monachil. Sierra Nevada. Collado del Diablo. VG6407. Enebral-piornal. Micaesquistos. 2300m.s.m. 27/07/2010. Navarro, Rodriguez & Casimiro-Soriguer Solanas (MGC72167)

Armeria malacitana Nieto Feliner

Málaga: Alhaurín el Grande. Sierra de Mijas. Puerto de la Encina. UF 55. 27/05/1983. Cabezudo & Pérez Sanz (MGC 15521); ibidem. 19/06/1991. Cabezudo & Hidalgo (MGC 32222); ibidem. Pico Mijas. UF5153. Arenas dolomíticas. 1150 m.s.m. 24/05/1994. Gil, Navas & Navas (MGC 39569); ibidem. Subida al repetidor. Ternero & Gil. (MGC44761). Ojén. Puerto de Ojén. Dolomías sacaroideas. 12/05/1988. Cabezudo, Nieto & Pérez Latorre. (MGC24589). Coín. Sierra Blanca. La Albuquerqueira. UF 4055. Dolomías. 13/05/2009. Cabezudo, Pérez Latorre & Casimiro-Soriguer Solanas. (MGC 69814)

Armeria trianaei Nieto Feliner

Córdoba: Priego. La Tiñosa. Zona cacuminal. UG 9038. Roquedos umbríos. Calizo-dolomías. 1550 m.s.m. 15/06/1998. Triano, Jiménez Conejo et al. (MA 631755); Sierra Horconera. Pico Bermejo, bajando al canalizo de Peñalisa. UG54. 20/05/1982. G. Fernández. J. García & S. Silvestre (SEV76396, 82315, 82316, 82314)

Armeria villosa Girard subsp. *villosa*

Málaga: Yunquera. Sierra de las Nieves.

Entre la Cañada de los Hornillos y el Peñón de los Enamorados. UF26. 1350-1750 m.s.m. Cabezudo, Pérez Latorre, Gil, Navas & Navas (MGC 46786); *Ibidem*. Puerto de los Hornillos. UF2366. Calizas. 1300 m.s.m. 12/06/2002. Navas, Gil, Gavira & Navas (MGC52284); *Ibidem*. Cañada de la Encina. UF2266. Matorral. Calizas. 1200m.s.m. 15/06/2003. Navas & Trias (MGC55178). Ronda. Sierra de las Nieves. Cañada de las Ánimas. UF2065. Tomillar nitrófilo. Calizas. 1360 m.s.m. 17/06/1997. Pérez Latorre, Navas, Gil & Navas (MGC46063); *Ibidem*. Subida al puerto de los Pilones por la Pista forestal. UF1962. Calizas. Matorral. 06/06/2001. Cabezudo *et al.* (MGC 49352). Tolox. Sierra de las Nieves. Picacho de Fatalandar. UF 2562. Rupícola. Dolomías. 2/7/214. Cabezudo, Pérez Latorre & Casimiro-Soriguer Solanas. (MGC 79-626).

Armeria villosa subsp. *alcaracensis* Nieto Feliner

Albacete: La Mesta. 2/06/1934. González Albo (MA349602); Bienservida. Confluencia del río Guadalmena y cañada del Conejo. WH2367. Pastizales sobre cuarcitas. 13/05/1996. J. Herranz. (MA586744); Vianos. WH4177. Cuarcitas y margas triásicas. 960 m.s.m. 28/05/1996. J. Herranz (MA586743)

Armeria villosa subsp. *bernisii* Nieto Feliner

Granada: Alhama de Granada. Sierra Almijara. Carril de la Resinera al Navachica. VF2781. Dolomías. 11/07/1996. Cabezudo, Pérez Latorre, Gil, Navas & Navas (MGC 44202); *Ibidem*. Cortijo de Pantaneta, bajo Loma del Águila. VF2582. 1100m.s.m. 2/06/2004. Cabezudo, Pérez Latorre, Caballero & Gavira (MGC59678). Órgiva. Sierra de Lujar. Cara NE. Calizas. 1660m.s.m. 17/06/1996. Pérez Latorre, Navas & Navas (MGC44194). Mecina Bombarón. Pista al Pto. de la Ragua. 1600-1800 m.s.m. 19/07/1995. Cabezudo, Talavera & Navas (MGC 42640). Ótivar. Sierra Almijara. Navachica, cara Oeste. VF 2976. Dolomías. 11/07/1996. Cabezudo, Pérez Latorre, Gil, Navas & Navas MGC (44193); **Almería:** María. Sierra de María, cara N. sobre los Alaminos. 1270-1750 m.s.m. 07/06/1995. Cabezudo, Pérez Latorre, Blanca & Cueto (MGC39691)

Armeria villosa subsp. *longiaristata* (Boiss. & Reut.)

Nieto Feliner

Málaga: Alfarnate. Sierra de Alfarnate.

26/06/1919. Gros. (MA 145441). Antequera. Sierra Llana. In glareosis. 14/06/1930. Vicioso. (MA 145419). El Burgo. Sierra Cabrilla. UF3172. Rupícola. Calizas. 26/05/2010. Gavira & Casimiro-Soriguer Solanas (MGC71692); *ibidem*. Sierra de las Cabras. Collado de los Lastonares. UF6992. Arcillas-calizas. 1192m.s.m. 09/07//2012. García-Sánchez & Casimiro-Soriguer Solanas (MGC75791); *Ibidem*. Sierra de Huma. Zona superior. UF4388. Rupícola. Calizas. 1050 m.s.m. 30/05/2013. Cabezudo, Pérez Latorre, Hidalgo & Casimiro-Soriguer Solanas (MGC77619). Parauta. Cancha Almola. UF0860. Dolomías. 1100m.s.m. 12/06/2004. Gavira (MGC60717). Valle de Abdalajis. Sierra de Huma. Paredón. Calizas. 840m.s.m. 14/06/1996. Cabezudo & Pérez Latorre (MGC44200). Ronda. Sierra de las Nieves. Subida al Pto. De los Pilones. Calizas. 12/06/1996. Nieto & Navas (MGC43321). **Granada:** Puerto de los Alazores. 09/06/1965. Rivas Goday & Borja (MGC4361). Jayena. Sierra Almijara. Bco. de la casa de Orihuela. VF3184. Dolomías. 1250 m.s.m. 24/06/2003. Cabezudo, Pérez Latorre, Caballero & Navas (MGC60339). **Cádiz:** Grazalema. Sierra del Pinar. Subida al Torreón. TF8371. 1000-1600 m.s.m. 17/07/1984. Aparicio & Silvestre (MGC29522)

Armeria villosa subsp. *provillosa* (Bernis) Nieto Feliner

Ciudad Real: Montes alrededor de la Vega del río Tovar. 25/05/1934. González Albo (MGC 145496). Aldea de San Pedro. Lagunas de Ruidera. 28/05/1933. González Albo (MA145502). **Jaén:** Villarodrigo. La Mangada. WH2756. Prados sobre margas calizas. 980m.s.m. 19/06/1984. Fernández (MA403427)

DEDICATORIA. Dedicamos este trabajo a Carlos Vicioso, Francisco Bernis, Gonzalo Nieto Feliner y Juan A. Devesa. Carlos Vicioso recolectó y estudió por primera vez la Sierra de Alcaparaín y suyo es el pliego original (Holotypus) de *A. grajoana* (sub. *A. villosa* var. *carratracensis*). A Francisco Bernis y Gonzalo Nieto Feliner por su larga y fructífera dedicación al estudio del complejo género *Armeria*. Agradecemos a Juan Antonio Devesa la lectura crítica del manuscrito y sintiendo no haber tenido en consideración alguna de sus sugerencias sobre nomenclatura.

BIBLIOGRAFÍA

- BERNIS, F. -1955- Revisión del género *Armeria* con especial referencia a los grupos ibéricos. Parte 2ª. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 12 (2): 77-252
- BLANCA, G., B. CABEZUDO, M. CUETO, C. FERNÁNDEZ LÓPEZ & C. MORALES TORRES. (Eds.) -2009- *Flora Vascular de Andalucía Oriental*. Junta de Andalucía. Sevilla.
- CABEZUDO, B., Y. GIL, A. V. PÉREZ LATORRE, P. NAVAS, D. NAVAS & T. NAVARRO -2000- *Armeria villosa* subsp. *carratracensis* (Bernis) Nieto Feliner. In Blanca, G., B. Cabezudo, J.E. Hernandez-Bermejo, C. M. Herrera, J. Muñoz & B. Valdés (Eds.). *Libro rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía. Tomo II, Especies Vulnerables*. Junta de Andalucía.
- CABEZUDO, B., Y. GIL, A. V. PÉREZ LATORRE, P. NAVAS & D. NAVAS -2003- *Armeria villosa* subsp. *carratracensis* (Bernis) Nieto Feliner. In Bañares, Á., G. Blanca, J. Guemes, J. C. Moreno & S. Ortiz (Eds.). *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular, Amenazada de España*. DGCN. Madrid.
- CEBALLOS, L. & C. VICIOSO -1933- *Estudio sobre la vegetación y la flora forestal de la provincia de Málaga*. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias. La Moncloa, Madrid.
- DEVESA, J.A. & R. PINTO DA SILVA -1984- *Armeria maritima* subsp. *alpina* (Willd.) Pinto da Silva en el sur de España. *Anales del Jardín Botánico de Madrid* 40(2): 466-467.
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. -1975- Contribución al estudio florístico y fitosociológico de Sierra de Aguas. *Acta Bot. Malacitana* 1: 81-205.
- NIETO FELINER, G. -1987- El género *Armeria* (Plumbaginaceae) en la Península Ibérica: aclaraciones y novedades para una síntesis. *Anales Jardín Botánico de Madrid*, 44(2): 319-348
- NIETO FELINER, G. -1990- *Armeria* Willd. In: Castroviejo S., Lainz M., López González G., Montserrat P., Muñoz Garmendia F., Paiva J., Villar L., eds. *Flora Iberica*. Madrid: Real Jardín Botánico, vol. 2, 642-721.
- NIETO FELINER, A. IZUZQUIZA & A.R. LANSAC -1996- Natural and experimental hybridization in *Armeria* (Plumbaginaceae): *A. villosa* subsp. *carratracensis*. *Pl. Syst. Evol.* 201: 163-177 .
- NIETO FELINER, G., J. FUERTES AGUILAR & J. A. ROSSELLÓ -2001- A new species of *Armeria* (Plumbaginaceae) from southern Spain with molecular and morphometric evidence on its origin. *Bot. J. of the Linnean Society* 135:71-84
- PÉREZ LATORRE, A. V. & B. CABEZUDO -2002- La flora y el paisaje vegetal de la provincia de Málaga: importancia y conservación. *Jábega* 90: 25-39.
- PÉREZ-LATORRE, A. V., N. HIDALGO & B. CABEZUDO -2013- Composition, ecology and conservation of south-Iberian serpentine flora in the context of the Mediterranean basin. *Anales Jardín Botánico Madrid* 70:62-71.
- RIVAS MARTÍNEZ, S. -1988- Bioclimatología, biogeografía y series de vegetación de Andalucía Occidental. *Lagascalia* 15 (extra): 91-119.
- RIVAS MARTÍNEZ, S., A. ASENSI, J. MOLERO MESA & F. VALLE -1991- Endemismos vasculares de Andalucía. *Rivasgodaya* 6: 5-76
- RIVAS -MARTINEZ, S. & coautores -2011a- Mapa de series , geoseriessy geopermaseries de vegetación de España. *Itinera geobotanica* 18-1: 5.424.
- RIVAS -MARTINEZ, S. & coautores -2011b- Mapa de series , geoseriessy geopermaseries de vegetación de España. *Itinera geobotanica* 18-II: 425-800.
- VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. F. GALIANO -1987- *Flora Vascular de Andalucía Occidental*. Ed. Ketres.